

Kraniofaringeom pri otrocih in odraslih

Jensterle M, Jazbinsek S, Bosnjak R, Popovic M, Zdravec Zaletel L, Vipotnik Vesnaver T, Faganel Kotnik B, Kotnik P

Izhodišča. Kraniofaringeom v otroški in odrasli dobi je redek tumor embrionalnega izvora, ki se nahaja v selarnem, supraselarnem in paraselarnem področju. Kljub velikemu odstotku preživelih je zaradi lokacije in posledic zdravljenja tumorja obolevnost zaradi endokrinoloških izpadov, prizadetosti vida, presnovnih zapletov, kognitivnih in psihosocialnih posledic velika. Posledično je kakovost življenja bolnikov pomembno znižana. Trenutno ni splošno sprejetih smernic za zdravljenje kraniofaringeoma. Subtotalna resekcija, ki ji sledi radioterapija, je priporočena pri tumorjih, ki že ob postavitvi diagnoze vraščajo v hipotalamus, da bi ne prišlo do dodatne poškodbe le tega. Novejša spoznanja na področju molekularne patologije tumorja ponujajo možnost uporabe tarčne terapije, ki bi v prihodnosti lahko zmanjšala obolevnost povzročeno z zdravljenjem.

Zaključki. Kraniofaringeom je kronična bolezen z doživljenjskim sledenjem. Za najboljši izhod bolnikov je že ob diagnozi ter načrtovanju zdravljenja potrebna multidisciplinarna obravnava, v kateri sodelujejo izkušeni nevrokirurgi, nevroradiologi, nevroonkologi, patologi in endokrinologi.